

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Флуник для купирования воспалительных процессов и снятия болевых синдромов различной этиологии у крупного рогатого скота, лошадей и свиней

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Флуник (Flunic).
Международное непатентованное наименование: флуниксин.
2. Лекарственная форма: раствор для инъекций.
Флуник в 1 мл содержит в качестве действующего вещества флуниксин меглумин - 83 мг (эквивалентно 50 мг флуниксина), вспомогательные вещества: фенол, натрия формальдегид сульфоксилат, динатрия ЕДТА, пропилен гликоль, диэтаноламин, соляную кислоту 2N (для коррекции pH = 8,0-9,0), воду для инъекций.
3. По внешнему виду препарат представляет собой бесцветную или светло-желтого цвета прозрачную жидкость.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя - 2 года со дня производства, после первого вскрытия флакона - 28 суток. Запрещается применение препарата после истечения срока годности.
4. Выпускают расфасованным в стеклянные флаконы по 50, 100 и 250 мл, упакованные в индивидуальные картонные коробки вместе с инструкцией по применению.
5. Хранят в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 2°C до 25°C.
6. Флуник следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. Фармакотерапевтическая группа: нестероидные противовоспалительные лекарственные препараты.

Флуниксин меглумин, входящий в состав препарата, является неселективным ингибитором циклооксигеназ (ЦОГ1 и ЦОГ2), предотвращая переход арахидоновой кислоты в простагландины, снижает тем самым выработку простагландинов E2. Снижение выработки медиаторов воспаления обуславливает анальгетический, жаропонижающий, противовоспалительный и антитоксический эффект флуниксина.

После парентерального введения препарата флуниксин меглумин быстро всасывается и проникает во все органы и ткани, достигая максимальной концентрации в крови через 5-45 минут; несмотря на короткий период полувыведения (2-8 часов), накапливается в очаге воспаления, обеспечивая терапевтический эффект в течение 24 часов. Флуниксин меглумин в значительной степени связывается с белками плазмы (до 99%), из организма выводится преимущественно с фекалиями (около 80%) и частично с мочой.

Флуник по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Флуник назначают крупному рогатому скоту, лошадям и свиньям в качестве противовоспалительного, обезболивающего и жаропонижающего препарата при острых воспалительных процессах и болевых синдромах, в том числе: крупному рогатому скоту - в комплексной терапии респираторных (в том числе эмфиземы легких), желудочно-кишечных, офтальмологических заболеваний и мастита; свиньям - в комплексной терапии

респираторных заболеваний и синдрома мастит-метрит-агалактия (ММА); лошадям - для купирования воспаления и снятия болевого синдрома при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, острых воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, коликах, септическом эндотоксическом шоке, после хирургических вмешательств, а также при бактериальных и вирусных инфекциях.

12. Противопоказанием к применению препарата является индивидуальная повышенная чувствительность животного к одному из компонентов препарата (в том числе в анамнезе). Не допускается внутриаортального введения Флуник. Не следует применять препарат животным с патологией сердечно-сосудистой системы, печени, почек, в случае гиповолемии (за исключением эндотоксемии или септического шока), при риске желудочно-кишечного кровотечения, животным моложе 6-недельного возраста, поросётам массой менее 6 кг и старым животным. Если назначение препарата при указанных противопоказаниях нельзя отменить, а также при необходимости его назначения совместно с общей анестезией, Флуник применяют с осторожностью под строгим контролем ветеринарного врача.

13. Флуник применяют внутривенно или внутримышечно в зависимости от вида животного и патологического процесса, в следующих дозах:

- крупному рогатому скоту - внутривенно или внутримышечно один раз в сутки в дозе 2 мл на 45 кг массы животного (2,2 мг флуниксина на 1 кг массы) в течение 1-3 суток до улучшения клинического состояния, но не более 5 последовательных дней;

- лошадям - внутривенно: при заболеваниях опорно-двигательного аппарата один раз в сутки в дозе 1 мл на 45 кг массы животного (1,1 мг флуниксина на 1 кг массы) до исчезновения клинических симптомов, но не более 5 последовательных дней; для купирования висцеральных болей при коликах однократно или двукратно в зависимости от клинического состояния в дозе 1 мл на 45 кг массы животного (1,1 мг флуниксина на 1 кг массы); при острых воспалительных процессах в желудочно-кишечном тракте, эндотоксемии и септическом шоке, связанными с нарушением кровообращения в желудочно-кишечном тракте, в дозе 1 мл на 200 кг массы животного (0,25 мг флуниксина на 1 кг массы) каждые 6-8 часов, но не более 5 введений.

- свиньям внутримышечно однократно в область шеи в дозе 2 мл на 45 кг массы (2,2 мг флуниксина на 1 кг массы).

Вводить препарат следует медленно, предварительно подогрев до температуры тела животного.

В связи с возможной болевой реакцией внутримышечно препарат не следует вводить в одно место крупным животным в объеме, превышающем 5 мл, и мелким животным - в объеме, превышающем 2,5 мл.

14. При передозировке препарата у животного возможны симптомы нарушения функции желудочно-кишечного тракта, рвота, ацидоз. В этих случаях следует назначить средства дезинтоксикационной и симптоматической терапии.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Препарата не следует применять беременным самкам.

17. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Флуник в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У отдельных животных в редких случаях возможно снижение аппетита, диарея, рвота, поражение слизистой желудочно-кишечного тракта, изменение биохимических показателей, характеризующих работу почек. В этом случае необходимо прекратить применение Флуник и обратиться к ветеринарному врачу. У свиней в месте инъекции возможно образование припухлости, которая не требует специальной терапии и полностью исчезает в течение 14 суток. В

случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и при необходимости назначают десенсибилизирующую терапию.

19. Флуник не следует назначать одновременно с другими нестероидными противовоспалительными средствами, кортикостероидами, антикоагулянтами, противоконвульсионными лекарственными средствами, аминогликозидами и солями лития.

20. Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее, чем через 8 суток после внутривенного и не ранее чем через 35 суток после внутримышечного введения, свиней - не ранее чем через 24 дня, лошадей - не ранее чем через 8 суток после последнего применения Флуник. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

Молоко дойных животных разрешается использовать в пищевых целях не ранее чем через 60 часов после последнего применения препарата. Молоко, полученное ранее установленного срока, может быть использовано после кипячения в корм животным.

IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Флуником необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

22. Во время работы с препаратом запрещается курить, пить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Флуником.

Пустую упаковку из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

23. При случайном попадании лекарственного препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза - промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименование и адрес
производственной площадки
производителя лекарственного препарата
для ветеринарного применения:

"Qilu animal health products Co.,
Ltd", Адрес: No. 243 Gong Ye
Bei (Gongye North) Road,
г. Цзинань, China. KHP

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного препарата
на принятие претензий от потребителя.

ООО «Ветимпульс», Россия,
600901, мкр. Юрьевец,
ул. Сиреневая, д.88
тел.: +7 499 322-16-70
e-mail: info@vetimpuls.ru

Номер регистрационного удостоверения: РК-ВП-4-2402-13