

ЭФИКУР (EFICUR)

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Эфикура для лечения болезней бактериальной этиологии у крупного рогатого скота и свиней

Организация-разработчик: «Лабораториос Хипра С.А.»/
«Laboratorios Hipra, S.A.», Авда ла Сельва, 135 17170 Амер (Жирона) Испания

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Эфикур (Eficur). Международное непатентованное наименование: цефтиофур.
2. Лекарственная форма: суспензия для инъекций. Эфикур в 1 мл содержит в качестве действующего вещества цефтиофур в форме гидрохлорида - 50 мг.
3. По внешнему виду лекарственный препарат представляет собой суспензию светло-желтого цвета. При хранении возможно образование осадка, исчезающего при взбалтывании.
- Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения и транспортирования 2 года со дня производства. После вскрытия флакона препарат необходимо использовать в течение 28 суток.
- Запрещается использовать Эфикур по истечении срока годности.
4. Эфикур расфасован по 50, 100 и 250 мл в стеклянные или полиэтиленовые флаконы соответствующей вместимости, герметично укупоренные резиновыми пробками. Каждый флакон упакован в индивидуальную картонную коробку, в которую вкладывают инструкцию по применению.
5. Эфикур хранят и транспортируют в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от света месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 5 °C до 25 °C.
6. Эфикур следует хранить в местах, недоступных для детей.
7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

9. Эфикур относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы цефалоспоринов. Цефтиофур гидрохлорид, входящий в состав лекарственного препарата, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Fusobacterium necrophorum*, *Arcanobacterium pyogenes*, включая штаммы, продуцирующие В-лактамазу. Механизм бактерицидного действия антибиотика заключается в ингибировании синтеза клеточной стенки бактерии. После парентерального введения препарат поступает в системный кровоток, быстро метаболизируется с образованием дефурилцефтиофура, который обладает эквивалентной цефтиофору антибактериальной активностью, обратно связывается с белками плазмы и концентрируется в местах воспаления. Максимальная концентрация антибиотика в плазме крови после парентерального введения препарата достигается через 0,5-2 часа и сохраняется на терапевтическом уровне не менее 24 часов. Выводится антибиотик из организма главным образом с мочой (свыше 55%) и частично с фекалиями, период полувыведения в зависимости от вида, возраста животного и способа введения составляет 10-19 часов. Эфикур по степени воздействия на организм относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

11. Эфикур назначают крупному рогатому скоту и свиньям с лечебной целью при респираторных заболеваниях, межпальцевом некробактериозе, остром послеродовом эндометрите и других инфекциях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к цефтиофору.
12. Противопоказанием к применению Эфикура является повышенная индивидуальная чувствительность животного к В-лактамам антибиотикам.
13. Эфикур применяют животным индивидуально парентерально один раз в сутки.
 - Свиньям при респираторных болезнях, вызванных *Pasteurella multocida*, *Actino-bacillus pleuropneumonia* и *Streptococcus suis*, препарат вводят внутримышечно в дозе 1 мл на 16 кг массы (3 мг цефтиофура на 1 кг массы животного). Курс лечения - 3-5 суток.

- Крупному рогатому скоту препарат вводят подкожно в дозе 1 мл на 50 кг массы животного (1 мг цефтиофура на 1 кг массы животного). Курс лечения при респираторных болезнях, вызванных *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* и *Histophilus somni*-3-5 суток; при остром межпальцевом некробактериозе (панариций, копытная гниль), вызванном *Fusobacterium necrophorum* и *Bacteroides melaninogenicus*- 3 суток.

При остром послеродовом эндометрите у коров, вызванном *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* и *Fusobacterium necrophorum*, препарат применяют в комплексной терапии первые 10 дней после отела. Курс лечения - 5 суток.

Перед каждым использованием флакон с препаратом следует тщательно встряхнуть.

14. При передозировке препарата у животного может наблюдаться снижение аппетита, воспалительная реакция в месте инъекций.

15. Особенностей действия при первом введении препарата и при его отмене не выявлено.

16. Возможно применение Эфикура коровам и свиноматкам в период беременности и лактации.

17. Следует избегать пропусков при введении очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести ее как можно скорее, далее интервал между введениями препарата не изменяется.

18. Побочных явлений и осложнений при применении Эфикура в соответствии с настоящей инструкцией, как правило, не наблюдается. У некоторых животных в месте инъекций возможно проявление местной реакции в виде отека, который самопроизвольно рассасывается в течение 10-20 суток. При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и проявлении аллергических реакций применение препарата прекращают и животному назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

19. Эфикур не следует назначать одновременно с тетрациклинами и левомицетином, в связи со снижением его бактерицидной активности, аминогликозидами, фуросемидом и этакридиновой кислотой из-за возможного усиления нефротоксического эффекта.

20. Убой крупного рогатого скота на мясо разрешается не ранее чем через 8 суток, свиней - не ранее чем через 5 суток после последнего применения Эфикура. Мясо животных, вынужденно убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям. Молоко дойных коров в период применения Эфикура используют в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

21. При работе с Эфикуром необходимо соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.
22. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз, их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Эфикуром.
23. В случае проявления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения.

«Лабораториос Хипра С.А.», адрес:

Авда ла Сельва, 135 17170 Амер (Жирона) Испания / «Laboratorios Hipra, S.A.»,
address Avda. La Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

«Лабораториос Хипра С.А.», адрес:

Авда ла Сельва, 135 17170 Амер (Жирона) Испания / «Laboratorios Hipra, S.A.»,
address Avda. La Selva, 135-17170 Amer (Girona), Spain

Номер регистрационного удостоверения 724-3-2.13-2878 № ПВИ-3-8.7/02291

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Эфикура для лечения болезней бактериальной этиологии у крупного рогатого скота и свиней, утвержденная Россельхознадзором 21 марта 2013 г.



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com